

대장내시경 검사 안내문

본 안내문을 검사 일주일 전에 꼭 확인하세요.

검사 전 준비로 대장약을 복용하고 장을 완전히 비워야 합니다.

1. 검사 전 주의사항

- 항응고제, 항혈소판제, 혈전용해제 등을 복용하시는 분은 처방해주신 **주치의와 상의하신 후 검사 7일 전부터 복용하지 않도록 합니다.** (헤파린, 와파린, 프라다кса, 쿠마딘, 아스피린, 아스트릭스, 플라빅스, 안플라그, 디스그렌, 플루런트 등)
- 인슐린 또는 당뇨약을 드시는 분은 검사 당일엔 드시지 마십시오.
- 혈압약, 심장약, 항경련제를 드시는 분은 당일 물과 함께 약을 드시되, 내시경 전에 알려주시기 바랍니다.
- 여성의 경우 임신 또는 임신가능성, 생리중인 경우 검사가 불가하오니 예약일을 변경해주시기 바랍니다.

2. 검사 전 준비사항

- 검사 3일 전부터 피해야 할 음식


씨 있는 과일(참외, 딸기, 키위, 포도 등), 잡곡류(흑미, 현미, 검정콩 등), 해조류(미역, 다시마, 김 등), 섬유질이 많고 질긴 음식(나물류, 뿌리음식, 고기류 등), 기타 적색이나 착색음료(포도 주스, 커피 등)

먹으면 안되는 음식



- 검사 전날 아침.점심은 가볍게 흰죽 또는 미음으로 반찬은 소금이나 간장으로 드시고, 점심 이후는 금식 하십시오. 생수는 드셔도 됩니다.

3. 대장약(크리쿨산) 조제법 및 복용법



- ① 검사 전날 저녁 8시~9시 A제 1포와 B제 1포를 1L 용기에 넣습니다.
- ② ①의 용기에 적당량의 물을 넣어 용해시키고, 추가로 용기의 표시선(1L)까지 물을 넣어준 후, 용액이 균질하게 섞이도록 흔듭니다.
- ③ 만들어진 크리쿨산 1L를 15분마다 250mL씩 4회에 나누어 신속하게 복용합니다.
▶ 조금씩 흘려마시면 안됩니다. ▶ 차가운 물에 녹여 복용하시면 더욱 마시기 편합니다.
- ④ **최소 물 500mL 이상을 추가로 복용합니다.**
- ⑤ 다음날 새벽 4~5시 사이에 ①~④ 과정을 반복하여 드신 후, 파마시메티콘액(가스제거제)을 복용합니다.

◎ 검사 전날 저녁 8시~9시 사이 - 총 1L(크리쿨산) 복용

◎ 검사 당일 새벽 4시~5시 사이 - 총 1L(크리쿨산) 복용

◎ 반드시 크리쿨액 2L와 물 1L를 전부 복용하셔야 정확한 대장검사를 할 수 있습니다.

◎ 간혹 장정결이 덜 된 경우 추가 복용을 하거나 추후에 검사하실 수 있습니다.

* 평소 변비가 있는 분은 검사 전날 저녁 9시에 돌코락스 2알을 복용하십시오.

4. 수면 내시경을 받을 수 없는 경우

- ▶ 호흡곤란, 각종 호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성 폐질환 등)이 있는 경우
- ▶ 심장질환이 있는 경우
- ▶ 만성 간질환(간경화, 간기능 이상을 동반한 만성 간염 등)
- ▶ 심한 코골이, 수면 무호흡 증후군
- ▶ 기타 고령(만 60세이상), 고도 비만 등

※ 검사 당일 노약자분은 보호자와 함께 내원해 주시고, 당일 운전은 금합니다.

※ 기타 문의사항이 있으시면 02-3475-7100 으로 전화주시기 바랍니다.